

# A korábbi védőoltásokat igazoló dokumentumok hiányában felajánlandó védőoltások



Betegség	Gyermekek és serdülők (18 év alatt)	Felnőttek (18 év felett)
<b>Kiemelt fontosságú oltások</b>		
<b>Covid19</b>	<p>Az erre alkalmas gyermekeknek és serdülőknek a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően mRNS-vakcinából álló elsődleges oltási sorozatot kell felajánlani (az EU/EGT országaiban az engedélyezett vakcinák a Comirnaty 5 éves vagy idősebb gyermekeknek, illetve a Spikevax a 6 éves vagy idősebb gyermekeknek). Serdülők számára emlékeztető oltást kell felajánlani az EU/EGT tagállamaiban engedélyezett életkorban.</p> <p>A 12 éves vagy annál idősebb serdülők részére a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően emlékeztető oltást kell felajánlani (kizárólag a Comirnaty engedélyezett az EU/EGT területén).</p>	<p>A fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően minden felnőtt részére fel kell ajánlani az elsődleges és emlékeztető oltás(oka)t. Fontolóra vehető egy adagból álló elsődleges oltási sor (pl. Janssen Covid19-vakcina) alkalmazása, különösen, ha esetleg problémát jelentene az elsődleges oltási sor befejezéséhez szükséges második adag beadása.</p>
<b>Kanyaró mumpsz rubeola</b>	<p>9 hónapos vagy annál idősebb személyek részére fel kell ajánlani az MMR-oltást. Két adag MMR-vakcinát* kell beadni, az adagok között legalább egy hónapos, de lehetőleg még nagyobb különbséggel, a fogadó országban hatályos iránymutatásokkal összhangban. A 12 hónapos kor előtt beadott kanyaró vakcina nem mindenki esetén vált ki védelmet, és azt 12 hónapos kor után meg kell ismételni.</p>	<p>Egy adagot, vagy a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelő adagokat kell felajánlani.*</p>
<b>Diftéria tetanusz szamárköhögés polio Hib</b>	<p>2 hónapos vagy annál idősebb személyeknél a DTaP-IPV-Hib-tartalmú vakcinák három, egymástól legalább egy hónap eltéréssel beadott adagját kell felajánlani (a Hib-komponenst csak 6 éven felüli gyermekek esetén, kivéve, ha az országban érvényes egyéb ajánlások máshogy írják elő), majd a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelő emlékeztető oltást. A pentavalens és hexavalens kombinált védőoltások hat éves életkorig engedélyezettek.</p>	<p>Felnőttek esetén a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően a DTaP-IPV ** tartalmú vakcinák három adagját kell felajánlani.</p>
<b>Mérlegelendő</b>		
<b>Hepatitis B</b>	<p>2 hónapos vagy annál idősebb személyeknél kell felajánlani a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően három adagot. **</p> <p>HBsAG-pozitív anyától született újszülött csecsemők esetén a születést követő 24 órán belül kell felajánlani, a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően.</p>	<p>Minden felnőtt részére fel kell ajánlani, korábbi szűrővizsgálattal vagy anélkül, a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően.</p>
<b>Meningococcusok okozta betegség</b>	<p>A fogadó országban hatályos iránymutatásokat kell alkalmazni a Meningococcus A, B, C, W135 és Y szerotípusai elleni vakcinák esetén, a járványügyi helyzet figyelembevételével.</p>	
<b>Pneumococcus betegség</b>	<p>A 2 hónapos vagy annál idősebb személyeknek fel kell ajánlani valamely konjugált vakcina 1–3 adagját, egymástól legalább egy hónap különbséggel beadva, a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően.</p>	<p>65 éves vagy idősebb személyeknek fel kell ajánlani, a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően.</p>
<b>Varicella*</b>	<p>A fogadó országban hatályos iránymutatásokat kell követni, kivéve, ha a járványügyi helyzet mást indokol. Alkalmazás esetén 11 hónapos vagy idősebb személyeknek két adagot kell felajánlani, legalább egy hónap, de lehetőleg ennél nagyobb különbséggel beadva.</p>	<p>A fogadó országban hatályos iránymutatásokat kell követni a járványügyi helyzet figyelembevételével. Fontolóra kell venni az immunitással nem rendelkező, nem terhes, fogamzóképes korú nők oltását.</p>
<b>Influenza</b>	<p>A fogadó országban hatályos iránymutatásokat kell követni, kivéve, ha a járványügyi helyzet mást indokol. Fontolóra kell venni a hat hónaponál idősebb kockázati csoportok oltását az influenzaszezon előtt és alatt.</p>	<p>A fogadó országban hatályos iránymutatásokat kell követni a járványügyi helyzet figyelembevételével. Fontolóra kell venni a kockázati csoportok tagjainak, köztük a terhes nők oltását az influenzaszezon előtt és alatt.</p>
<b>Tuberkulózis</b>	<p>A BCG-oltást a fogadó országban hatályos iránymutatásoknak megfelelően kell felajánlani. A BCG-vel történő ismételt oltás nem javasolt.</p>	<p>A BCG általában nem javasolt felnőttek esetén, a járványügyi helyzettől függően.</p>

\* Az MMR és Varicella elleni védőoltások ellenjavalltak legyengült immunrendszerű személyeknél és terhesség alatt. Az MMR-oltást követően a teherbe esést egy hónapig el kell kerülni.

\*\* A vakcina beadása előtt el kell végezni a hepatitis B vírussal való fertőzést vizsgáló teszteket (HBsAg), a fogadó országban hatályos iránymutatásoktól függően.