

Vaccinări care trebuie efectuate în lipsa unor documente care să dovedească vaccinarea anterioară

Boală		Adulți și adolescenți (< 18 ani)	Adulți (> 18 ani)
Vaccinări prioritare			
COVID-19	▶	Administrați o schemă de vaccinare primară cu un vaccin ARNm copiilor și adolescenților eligibili, în conformitate cu orientările din țara gazdă (în UE/SEE sunt autorizate Comirnaty pentru vârsta ≥ 5 ani și Spikevax pentru vârsta ≥ 6 ani). Administrați o doză de rapel adolescenților de vârstă eligibilă în UE/SEE. Administrați o doză de rapel adolescenților cu vârsta ≥ 12 ani, în conformitate cu orientările din țara gazdă (în UE/SEE este autorizat doar Comirnaty).	Administrați schema de vaccinare primară și doza (dozele) de rapel tuturor adulților, în conformitate cu orientările din țara gazdă. Se poate lua în considerare utilizarea unei scheme primare de vaccinare cu o singură doză (de exemplu, COVID-19 Vaccine Janssen), în special dacă administrarea unei a doua doze pentru completarea schemei primare ar putea fi dificilă.
Rujeolă oreion rubeolă	▶	Administrați ROR persoanelor cu vârsta ≥ 9 luni. Trebuie administrate două doze de ROR* la cel puțin o lună distanță, dar preferabil la un interval mai lung, în conformitate cu orientările din țara gazdă. Vaccinul rujeolic administrat înainte de vârsta de 12 luni nu induce protecție la toate persoanele și trebuie repetat după 12 luni.	Administrați fie o singură doză, fie schema recomandată de orientările din țara gazdă*.
Difterie tetanos tuse convulsivă poliomielită Hib	▶	Administrați persoanelor cu vârsta ≥ 2 luni trei doze de vaccinuri DTaP-IPV-Hib (componenta Hib numai pentru copiii cu vârsta < 6 ani, cu excepția cazului în care există alte recomandări specifice țării respective) la cel puțin o lună distanță, urmate de o doză de rapel în conformitate cu orientările din țara gazdă. Vaccinurile combinate pentavalent și hexavalent sunt autorizate până la vârsta de șase ani.	Administrați tuturor adulților schema primară de vaccinuri împotriva difteriei, a tetanosului și a poliomielitei sau schema prevăzută de orientările din țara gazdă.
De luat în considerare			
Hepatita B	▶	Administrați trei doze persoanelor cu vârsta ≥ 2 luni, în conformitate cu orientările din țara gazdă. ** În cazul nou-născuților cu mame AgHBs pozitive, vaccinul se administrează în primele 24 de ore de la naștere, în conformitate cu orientările din țara gazdă.	Administrați tuturor adulților, cu sau fără screening prealabil, în conformitate cu orientările din țara gazdă.
Boala meningococică	▶	Aplicați orientările din țara gazdă pentru vaccinurile meningococice împotriva serogrupurilor A, B, C, W135 și Y, ținând seama de situația epidemiologică.	
Boala pneumococică	▶	Administrați persoanelor cu vârsta ≥ 2 luni 1-3 doze de vaccin conjugat la cel puțin o lună distanță, în conformitate cu orientările din țara gazdă.	Administrați persoanelor cu vârsta ≥ 65 de ani, în conformitate cu orientările din țara gazdă.
Varicelă*	▶	Trebuie respectate orientările din țara gazdă, cu excepția cazului în care situația epidemiologică impune altceva. Dacă se utilizează vaccin varicelic, administrați două doze persoanelor cu vârsta ≥ 11 luni, la cel puțin o lună distanță, dar preferabil la un interval mai lung.	Trebuie urmate orientările din țara gazdă, ținând seama de situația epidemiologică. Luați în considerare vaccinarea femeilor neimunitate aflate la vârsta fertilă și care nu sunt gravide.
Gripă	▶	Trebuie respectate orientările din țara gazdă, cu excepția cazului în care situația epidemiologică impune altceva. Luați în considerare vaccinarea grupurilor de risc cu vârsta de peste șase luni înaintea și în timpul sezonului gripal.	Trebuie urmate orientările din țara gazdă, ținând seama de situația epidemiologică. Luați în considerare vaccinarea grupurilor de risc, inclusiv a femeilor gravide, înaintea și în timpul sezonului gripal.
Tuberculoză	▶	Administrați BCG în conformitate cu orientările din țara gazdă. Nu se recomandă revaccinarea cu BCG.	În general, BCG este nerecomandat la adulți, în funcție de situația epidemiologică.

* Vaccinul ROR și cel varicelic sunt contraindicate la persoanele imunocompromise și în timpul sarcinii. Sarcina trebuie evitată timp de o lună după vaccinarea ROR.
** Înainte de administrarea vaccinului ar putea fi efectuate teste pentru depistarea infecției cu virusul hepatitei B (AgHBs), în funcție de orientările din țara gazdă.