

Вакцинації, які пропонуватимуть за відсутності задокументованих свідчень попередньої вакцинації



Захворювання	Діти та підлітки (віком < 18 років)	Дорослі (> 18 років)
Пріоритетні вакцинації		
COVID-19	<p>Запропонувати курс первинної вакцинації мРНК-вакциною дітям і підліткам, які відповідають вимогам, згідно з настановами країни перебування (в ЄС/ЄЕП дозволені вакцини Comirnaty з віку ≥ 5 років і Spikevax з віку ≥ 6 років). Запропонувати бустерну дозу підліткам, який дозволено в ЄС/ЄЕП.</p> <p>Запропонувати бустерну дозу підліткам віком ≥ 12 років відповідно до настанов країни перебування (в ЄС/ЄЕП дозволена лише вакцина Comirnaty).</p>	<p>Запропонувати первинну вакцинацію та бустерну дозу(-и) всім дорослим відповідно до настанов країни перебування.</p> <p>Можна розглянути доцільність проведення курсу первинної вакцинації з введенням однієї дози вакцини (наприклад, вакцини проти COVID-19 Janssen), особливо якщо введення другої дози для завершення первинної вакцинації може бути ускладненим.</p>
Кір паротит краснуха	<p>Запропонувати вакцину КПК особам віком ≥ 9 місяців. Дві дози вакцини КПК* слід вводити з інтервалом щонайменше один місяць, але бажано, щоб інтервал був довшим, відповідно до настанов країни перебування. Вакцина проти кору, введена у віці до 12 місяців, не забезпечує захист у всіх людей, тому її слід вводити повторно після 12-місячного віку</p>	<p>Запропонувати введення однієї дози або згідно з настановами країни перебування.*</p>
Дифтерія правець кашлюк поліомієліт Ніб	<p>Особам ≥ 2 місяці запропонувати введення трьох доз вакцини DTaP-IPV-Hib (компонент Hib лише для дітей віком до < 6 років, якщо немає інших рекомендацій для конкретної країни) з інтервалом щонайменше один місяць, із подальшим введенням бустерної дози відповідно до настанов країни перебування. П'ятивалентні та шестивалентні комбіновані вакцини дозволяється вводити дітям віком до шести років.</p>	<p>Запропонувати всім дорослим проведення первинного курсу вакцинації проти дифтерії, правця та поліомієліту або відповідно до настанов країни перебування.</p>
Розглянути доцільність		
Гепатит В	<p>Запропонувати особам віком ≥ 2 місяці введення трьох доз відповідно до настанов країни перебування. **</p> <p>Запропонувати провести вакцинацію в дітей, які народжені матерями з позитивним результатом аналізу на HBsAg, протягом 24 годин після народження, відповідно до настанов країни перебування</p>	<p>Запропонувати всім дорослим, незалежно від попереднього скринінгу, відповідно до настанов країни перебування.</p>
Менінгококова хвороба	<p>Дотримуватися настанов країни перебування щодо менінгококових вакцин проти серогруп А, В, С, W135 та Y з урахуванням епідеміологічної ситуації.</p>	
Пневмококова хвороба	<p>Запропонувати особам ≥ 2 місяці введення 1–3 доз кон'югованої вакцини з інтервалом щонайменше один місяць, відповідно до настанов країни перебування.</p>	<p>Запропонувати особам віком ≥ 65 років, відповідно до настанов країни перебування.</p>
Вітряна віспа*	<p>Слід дотримуватися настанов країни перебування, якщо епідеміологічна ситуація не передбачає інше. Якщо застосовується, запропонувати введення двох доз вакцини проти вітряної віспи особам віком ≥ 11 місяців з інтервалом щонайменше один місяць, але бажано, щоб інтервал був довшим.</p>	<p>Слід дотримуватися настанов країни перебування з врахуванням епідеміологічної ситуації.</p> <p>Розглянути доцільність вакцинації неімунізованих невагітних жінок, здатних завагітніти.</p>
Грип	<p>Слід дотримуватися настанов країни перебування, якщо епідеміологічна ситуація не передбачає інше.</p> <p>Розглянути доцільність вакцинації осіб віком від шести місяців, які належать до груп ризику, перед та під час сезону грипу.</p>	<p>Слід дотримуватися настанов країни перебування з врахуванням епідеміологічної ситуації.</p> <p>Розглянути доцільність вакцинації осіб із груп ризику, у тому числі вагітних жінок, перед та під час сезону грипу.</p>
Туберкульоз	<p>Запропонувати введення вакцини БЦЖ відповідно до настанов країни перебування. Повторне введення вакцини БЦЖ не рекомендується.</p>	<p>Вакцину БЦЖ зазвичай не рекомендується вводити дорослим, що залежить від епідеміологічної ситуації.</p>

* Вакцина КПК та вакцина проти вітряної віспи протипоказані людям з ослабленим імунітетом та під час вагітності. Слід запобігати виникненню вагітності протягом одного місяця після вакцинації КПК.

** Тести на інфекцію, зумовлену вірусом гепатиту В (HBsAg), можна виконувати до введення вакцини, залежно від настанов країни перебування.